

PILARIX

крем

PILARIX КРЕМ ЭТО СОВРЕМЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, КОТОРЫЙ ЭФФЕКТИВНО ПРЕДОТВРАЩАЕТ СИМПТОМЫ ГИПЕРКЕРАТОЗА КОЖИ. ЗА СЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ ГИДРАТАЦИИ РОГОВОГО СЛОЯ КОЖИ УСКОРЯЕТ ПРОЦЕССЫ РЕГЕНЕРАЦИИ. PILARIX ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЕ И ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЕТ.

Прочитайте все инструкцию внимательно перед использованием.



PILARIX КРЕМ СОДЕРЖИТ:

салициловую кислоту, которая обеспечивает отшелушивающее действие утолщенного рогового слоя кожи
мочевину, которая увлажняет и повышает эластичность рогового слоя
Пантенол, который оказывает успокаивающее и противовоспалительное действие в случаях раздражения кожи, независимо от причины
Аллантоин, который ускоряет регенерацию раздраженной, биологически поврежденной кожи
Масло ши, которое обеспечивает коже мягкость, гладкость, защищает от холода, ветра и солнечного облучения, может быстро залечить повреждения кожи

PILARIX КРЕМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ:

ухода за чрезмерно жесткой, сухой кожей на локтях, коленях, пятках
хронически сухой кожи
это идеальный способ тонирования - успокаивает после эпиляции
в качестве средства для ускорения регенерации кожи

PILARIX КРЕМ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Фолликулярный гиперкератоз
Экзема с фазой чрезмерного отслаивания
Хронически сухая кожа
В качестве средства ускорения регенерации кожи между периодами стероидотерапии

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕМА PILARIX:

Используйте 2 раза в день или по указанию врача или фармацевта. В случае раздражения кожи, обратитесь к врачу.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:

В случае применения эмульсии на поврежденной, раздраженной, воспаленной коже может произойти обострение воспаления сопровождаемое зудом. В таком случае следует прекратить использование крема.

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ:

Повышенная чувствительность к салициловой кислоте, мочедине. Беременность, период лактации. Возраст до 12 лет. Не применять крем на поврежденную кожу или слизистые оболочки. Не следует использовать у больных с печеночной и почечной дисфункцией. Не следует использовать у больных с симптомами аллергии или повышенной чувствительности к любому из компонентов.

РЕКОМЕНДАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Только для наружного применения. В случае приема внутрь, немедленно обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке. Хранить в сухом и темном месте при комнатной температуре, то есть с 15 до 25 C.

Продукт прошел дерматологические испытания и получил положительную оценку эффективности после исследования, проведенного в Институте медицинской косметики, ул. Свентокжиска 33а в Варшаве.

ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ:

PILARIX крем тубик 50 мл или 100 мл
После открытия полезность 6 месяцев.



LEFROSCH

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
LEFROSCH Sp. z o.o.
Сняты, ул. Велиховска 29
64-050 Велихово

ОТДЕЛ ПРОДАЖ:
ул. Йезерна 1, 62-052 Коморники
тел: 61 893 53 83, тел/fax 61 893 53 90
e-mail: lefrosch@lefrosch.com

www.lefrosch.com